


地点



DSC 诊所

31 Kelantan Lane #01-16 S(200031)

巴士服务 (维拉三美路对面)

23, 64, 65, 66, 67, 130, 139, 147, 857

最靠近的地铁站

武吉士 (东西线 / 市区线)

劳明达 (东西线)

花拉公园 (东北线)

梧槽 (市区线)

惹兰勿刹 (市区线)

爱之病/性病录音资讯线

6295 2944

爱之病/性病热线

1800 - 2521324 (办公时间)

与我们预约

请拨打

6293 9648 预约中心

或电邮至

apptdsc@nsc.com.sg 预约

更多诊所资料请查阅网址 WWW.DSC-CLINIC.SG
或上我们的脸书 WWW.FACEBOOK.COM/DSCSG

衣原体 CHLAMYDIA

什么是衣原体?

衣原体是新加坡最常见的性病之一，男性和女性都有可能受到感染。

衣原体感染如何传播?

衣原体感染主要的传播媒介是性交(肛交或生殖器性交)，通过人与人之间的阴茎或阴道粘膜接触而传播，衣原体感染也可能通过口交传播。

衣原体感染有哪些症状?

衣原体感染通常不会出现任何症状，尤其是女性，若产生任何不适，症状可能轻微及不明显。

男士	妇女
<ul style="list-style-type: none"> • 排尿时阴茎感觉疼痛 • 阴茎出现分泌物 • 排尿频率增加 	<ul style="list-style-type: none"> • 阴道出现异常分泌物 • 异常出血 • 下腹不适与疼痛 • 排尿时感觉疼痛

衣原体感染的症状何时出现?

因为大多数衣原体感染患者并没有出现任何的不适，因此衣原体感染也称之为“无声”感染。若出现症状，可能已受感染数周。

谁进该接受检验?

- 性生活频繁的人，尤其是年轻人。
- 曾与性工作者或非固定的性伴侣进行无防范措施的性行为。

衣原体感染如何检验?

- 通过专为检测衣原体的尿液样本检验
(注: 每间诊所不一定会以同样的方式去检测衣原体)
- 棉签样本 - 护士会在患处用棉签采集细胞样本

衣原体感染可以治吗?

衣原体感染可用抗生素根治，由于衣原体很容易在性伴侣之间传播，因此建议您和伴侣同时接受治疗，即使双方都没出现任何感染症状。在您服用抗生素以及您的性伴侣完成治疗之前，我们建议您避免进行性行为。

衣原体感染会造成其他问题吗?

男士	妇女
<ul style="list-style-type: none"> • 附睾炎(睾丸疼痛肿胀) • 直肠感染 	<ul style="list-style-type: none"> • 盆腔炎 (PID) 子宫与输卵管感染造成腹痛，输卵管创伤，不孕与宫外孕 (异常)

衣原体感染(或任何性传播疾病)可以增加感染人类免疫缺陷病毒(HIV)的风险，所以了解并注意感染症状及时向医生报告任何可疑症状，即使是轻微的症状，也是非常重要的。

怀孕期间受衣原体感染

怀孕期间受衣原体感染可能增加早产和死胎的几率。此外，女性患者产下的婴儿也可能在经过产道时受到感染，而有可能患上结膜炎或肺炎。怀孕的女性患者一般会服用不同的抗生素以进行治疗，才不会影响到胎儿。若您已经怀孕，或认为您有可能怀孕，请让医生知道，以便医生能开处正确的抗生素。

我需要回来复诊?

- 您会被安排在第3个月接受血液检验，检测梅毒与人类免疫缺陷病毒(HIV)。
- 您若在怀孕期间受衣原体感染，我们建议您在治疗后的第4个星期再次接受检验。
- 诊所会通过电话或书信联络错过复诊的病人，作为提醒。

注意事项

- 按照指示服用所有药物
- 确保您的伴侣也一起接受治疗
- 当两人都在接受治疗时，避免进行性行为

进行较安全性行为

- 进行无体液(阴道分泌或精液)交流的性行为。
- 每次进行性行为都正确的使用安全套
- 避免在进行性行为前/时过量饮酒，因为这将影响您的判断力

免责声明

根据目前的医学证据与意见，我们试图在病人治疗册上提供最全面最正确与最新的信息。然而，不同的资料来源与随着时间的推移，信息与意见可能有所不同。若您有任何问题，请咨询您的医生或医疗人员。