


Nota lanjut

Kami telah cuba untuk memberikan maklumat yang lengkap, tepat dan terkini dalam risalah ini pada bukti dan pendapat perubatan semasa. Walaubagaimanapun, maklumat dan nasihat mungkin berbeza-beza dari sumber-sumber yang berbeza mengikut masa. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, sila berjumpa dengan doktor anda atau penasihat kesihatan anda.

Lokasi Kami



Klinik DSC
31 Kelantan Lane #01-16 S(200031)

Perkhidmatan Bas

23, 64, 65, 66, 67, 130, 139, 147, 147A, 857

Stesen MRT terdekat

Bugis (EWL/ DTL)

Farrer Park (NEL)

Jalan Besar (DTL)

Lavender (EWL)

Rochor (DTL)

HIV / STI maklumat berekod
6295 2944

HIV / STI Hotline
1800 - 2521324 (Pada waktu pejabat)

Buat temujanji bersama kami

Hubungi pusat temujanji di talian 6293 9648
atau email di apptdsc@nsc.com.sg

UNTUK MENGETAHUI INFORMASI KLINIK LEBIH LANJUT SILA LAWATI WWW.DSC-CLINIC.SG
ATAU DI FACEBOOK KAMI DI WWW.FACEBOOK.COM/DSCSG

Apa itu Gonorea?

Gonorea adalah sejenis jangkitan bakteria yang disebarluaskan melalui seks. Ia boleh dijangkiti oleh kedua-dua lelaki dan wanita.

Bagaimana Gonorea boleh dijangkiti?

- Hubungan seks dengan orang yang dijangkiti (oral, faraj atau sek dubur)
- Ibu kepada anak (semasa bersalin normal)

Apakah tanda-tanda dan gejala-gejala?

Orang yang dijangkiti mungkin tidak mempunyai sebarang tanda-tanda atau gejala-gejala tetapi jika mereka hadir, mereka mungkin termasuk:

Lelaki	Wanita
<ul style="list-style-type: none">• Keluar cairan putih atau kuning dari zakar• sakit dan pedih atau iritasi sewaktu membuang air kecil• Keluar cairan rektum (sek dubur)	<ul style="list-style-type: none">• Keluar cecairan (putih atau kuning) di faraj• Kesakitan ketika membuang air kecil• Pendarahan• Keluar cairan rektum (sek dubur)

Bayi

Jangkitan di mata yang boleh menyebabkan buta.

Bila tanda-tanda dan gejala-gejala muncul ?

Gejala boleh dilihat 2 hingga 7 hari (atau lebih) selepas jangkitan. Kebanyakan jangkitan tekan dan rektum tidak menyebabkan gejala. Jangkitan di kalangan wanita sering tanpa gejala dan tidak disedari.

Bagaimana Gonorea didiaknos?

- sampel akan diambil dengan swab kapas dari kawasan yang terjejas.
- Ujian air kencing (DSC menggunakan ujian kultur dan PCR).

Bagaimanakah Gonorea dirawat?

- Ya, ia boleh sembah. Ia biasanya dirawat dengan suntikan antibiotik bersama-sama dengan antibiotik oral. Penyembuhan mungkin lebih sukar dengan kebangkitan gonorea ubat tahan.
- Gonorea mudah disebarluaskan antara pasangan seks, oleh itu kedua-dua anda dan pasangan anda perlu dirawat pada masa yang sama sebelum aktiviti seksual lagi.

Bolehkah Gonorea menyebabkan masalah lain?

Lelaki	Wanita
<ul style="list-style-type: none">• Epididymo - orchitis (penyebaran jangkitan kepada buah zakar dan tiub sperma menyebabkan kesakitan dan bengkak)	<ul style="list-style-type: none">• Kemandulan• Penyakit Radang Pelvik (PID) - jangkitan dalam rahim dan tiub menyebabkan sakit perut, tiub fallopio rosak, kemandulan dan ektopik (tidak normal) kehamilan

Lelaki dan Wanita

Jangkitan ini juga boleh merebak ke dalam aliran darah, sendi, kulit dan hati.

Gonorea ketika hamil

Wanita yang hamil boleh menyebarkan jangkitan kepada bayi mereka dan boleh menyebabkan jangkitan mata yang serius, malah boleh menyebabkan buta pada bayi.

Adakah saya perlu kembali untuk lawatan susulan?

- Lawatan susulan adalah penting untuk membolehkan doktor memastikan anda sembah.
- Jika anda mempunyai gonorea, kembali untuk temujanji susulan 14 hari dari tarikh rawatan.
- Ujian Ulang akan dilakukan semasa temujanji susulan.
- Anda akan diberikan tarikh temujanji di bulan yang ketiga untuk ujian sifilis dan HIV.
- Jika anda terlepas temujanji susulan anda, klinik akan menghubungi anda melalui telefon atau surat.

Nota Penting

- Dapatkan rawatan segera daripada doktor jika anda mempunyai gejala.
- Lelaki perlu menahan air kencing mereka untuk sekurang-kurangnya 4 jam sebelum melawat klinik. Ini membantu untuk memastikan ketepatan keputusan ujian.
- Elakkan seks sehingga doktor mengesahkan anda sudah sembah.
- Jangan ubati diri sendiri tanpa berjumpa doktor - kerana ia akan menyekat simptom-simptom jangkitan.
- Maklumkan kepada doktor anda terhadap sebarang alahan ubat.
- Pastikan pasangan seksual anda jalani pemeriksaan supaya mereka boleh menerima rawatan awal.
- Jangkitan boleh berlaku lagi kerana tidak ada yang kekal imuniti. Lakukan pemeriksaan secara tetap.

Mengamalkan seks yang selamat

- Seks tanpa pertukaran cecair badan (lelehan faraj, air mazi dan air mani).
- Penggunaan kondom dengan betul dan setiap kali anda melakukan hubungan seks.
- Elakkan minum alkohol yang berlebihan sebelum atau semasa seks, kerana ini boleh menjelaskan pertimbangan anda.